

Start:Bayes!

Verteilungen

Sebastian Sauer



Lernziele

Nach diesem Kapitel können Sie ...

- den Begriff der Zufallsvariablen erläutern
- Wahrscheinlichkeitsdichte und Verteilungsfunktion erläutern
- die Gleichverteilung erläutern
- die Binomialverteilung erläutern
- die halbe Normalverteilung erläutern
- die Exponentialverteilung erläutern
- zentrale Konzepte in R umsetzen



Zentrale Begriffe

Zufallsvariable (random variable)

- diskret vs. stetig
- **Wahrscheinlichkeitsdichte:** f , (probability) density
- **Wahrscheinlichkeitsfunktion:** kumulierte Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeitsmasse

Wichtige Verteilungen: Gleichverteilung, Normalverteilung, Standardnormalverteilung



Wichtige Verteilungen

Wichtige Verteilungen — Überblick

In diesem Kapitel lernen wir vier zentrale Verteilungen kennen:

1. **Gleichverteilung** — Indifferenz, alles gleich wahrscheinlich
2. **Binomialverteilung** — Anzahl Treffer bei n Wiederholungen
3. **Halbe Normalverteilung** — nur positive Werte
4. **Exponentialverteilung** — Alternative zur halben NV



Gleichverteilung





Gleichverteilung — Indifferenz als Grundlage

- Jede Ausprägung der Zufallsvariablen ist **gleichwahrscheinlich**
- Passend, wenn kein Grund besteht, eine Ausprägung für plausibler zu halten als eine andere
- Gibt es diskret **und** stetig

Definierendes Kennzeichen: die *konstante Dichte*



Gleichverteilung — Beispiel



- links: $\min = -1$, $\max = 1$, $\text{Dichte} = 1/2$ — bei $X = 0$ hat eine Einheit (-1 bis 0) 50 % Wahrscheinlichkeitsmasse
- rechts: $\min = 0$, $\max = 3$, $\text{Dichte} = 1/3$ — jede Einheit hat ca. 33 % Wahrscheinlichkeitsmasse

Binomialverteilung



Definition: Binomialverteilung

Definition: Binomialverteilung

Stellt die Wahrscheinlichkeit der Ergebnisse eines n -fach wiederholten binomialen Zufallsexperiments dar (zwei Elementarereignisse).

- interessiert: nur die *Anzahl* der k Treffer, nicht die Reihenfolge
- Trefferwahrscheinlichkeit p bleibt über alle Wiederholungen gleich (Ziehen mit Zurücklegen)
- Ergebnisse sind unabhängig voneinander (iid)

Notation

Zufallsvariable

X

Binomialverteilung


$\text{Bin}(n, p)$

ist verteilt nach $\sim$ mit Parametern n, p

$$X \sim \text{Bin}(n, k)$$


Anwendungsbeispiele: defekte Schrauben, Wirkung eines Medikaments, Zustimmung in einer Umfrage, Würfelwürfe, faire/unfaire Münze

Beispiel: Das Loskästchen



- Kästchen mit sehr vielen Losen: $\frac{2}{5}$ Treffer (T), $\frac{3}{5}$ Nieten (N)
- Ziehen mit Zurücklegen — Trefferwahrscheinlichkeit ändert sich praktisch nicht
- Frage: Wie wahrscheinlich sind bei 3 Zügen genau 2 Treffer?

Möglichkeiten zählen: 3 Lose, 2 Treffer



Pfad	Treffer	Wahrscheinlichkeit
TTT	3	$p^3 \approx 0.064$
TTN, TNT, NTT	2	$p^2q \approx 0.096$ (je)
TNN, NTN, NNT	1	$pq^2 \approx 0.144$ (je)
NNN	0	$q^3 \approx 0.216$

Binomialverteilung



Anzahl Pfade mal Pfad-Wahrscheinlichkeit

- Wahrscheinlichkeit *eines* günstigen Pfades:

$$Pr(A) = p^2 \cdot q^1 = \left(\frac{2}{5}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^1 \approx 0.096$$

- 3 günstige Pfade ohne Beachtung der Reihenfolge: TTN, TNT, NTT

$$Pr(A') = k \cdot Pr(A) = 3 \cdot 0.096 = 0.29$$

Die Wahrscheinlichkeit, bei 3 Zügen 2 Treffer zu erzielen, beträgt ca. **29 %**.



Formel der Binomialverteilung

i Theorem: Binomialverteilung

$$Pr(X = k|p, n) = \frac{n!}{k!(n - k)!} p^k (1 - p)^{n-k}$$

$$Pr(X = k|p, n) = \underbrace{\binom{n}{k}}_{\text{Anzahl Pfade}} \cdot \underbrace{p^k (1 - p)^{n-k}}_{\text{Pfad-Wahrscheinlichkeit}}$$

Übersetzung: Wahrscheinlichkeit = Anzahl der günstigen Pfade
mal Wahrscheinlichkeit eines günstigen Pfades.

Definition: Binomialkoeffizient

Definition: Binomialkoeffizient

Gibt an, auf wie vielen verschiedenen Arten man aus n Objekten k Objekte ziehen kann (ohne Zurücklegen, ohne Beachtung der Reihenfolge).

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n - k)!}$$

Lies: “Wähle aus n möglichen Ereignissen k günstige Ereignisse” — “ k aus n ” bzw. “ n über k ”

Fakultät

Man multipliziert alle natürlichen Zahlen von der gegebenen Zahl bis 1 herunter.

- $1! = 1$
- $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$
- $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$
- $0! = 1$ (per Definition)

In R: `factorial()` für die Fakultät, `choose()` für den Binomialkoeffizienten



Beispiel: 2 von 4 Freunden auswählen

- 2 freie Plätze im Auto, 4 Freunde wollen mitfahren
- Alle 4 wählen: $4! = 24$ Möglichkeiten
- Nur 2 von 4 (Reihenfolge zählt): $\frac{4!}{2!} = 12$
- Reihenfolge egal ("AB" = "BA"): durch $2!$ teilen

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = 6$$

6 mögliche Mitfahrer-Kombinationen: AB, AC, AD, BC, BD, CD



Weitere Beispiele: Binomialkoeffizient

Lotto (6 aus 49):

$$\binom{49}{6} = 13\,983\,816 \text{ Zahlenkombinationen}$$

Beförderung (11 aus 25 Personen):

$$\binom{25}{11} = \frac{25!}{11! \cdot (25 - 11)!} = 4\,457\,400 \text{ Kombinationen}$$

Rechnen mit der Binomialverteilung in R

- `dbinom(x, size, prob)` — Wahrscheinlichkeitsdichte/-funktion: $Pr(X = x)$
- `pbinom(q, size, prob)` — Verteilungsfunktion (kumuliert): $Pr(X \leq q)$
- `choose(n, k)` — Binomialkoeffizient
- `factorial(n)` — Fakultät

Beispiel: `dbinom(x = 2, size = 3, prob = 2/5)` — Wahrscheinlichkeit für 2 Treffer bei 3 Zügen, $p = 2/5$



Beispiel: Klausur mit 20 Richtig-Falsch-Fragen



Wie wahrscheinlich ist es, durch bloßes Raten *genau* 15 von 20 Fragen richtig zu haben?

```
1 dbinom(x = 15, size = 20, prob = .5)
2 # ≈ 0.01 (ca. 1 %)
```

Wie wahrscheinlich sind *höchstens* 15 Treffer?

```
1 pbinom(q = 15, size = 20, prob = .5)
2 # ≈ 0.99 (ca. 99 %)
```


Beispiel: Münzwürfe mit der Binomialverteilung



- 3 Münzwürfe, genau 3× Kopf: $Pr(X = 3) = (1/2)^3 = 0.125$
- Ist die Binomialverteilung symmetrisch? Ändert sich die Wahrscheinlichkeit linear?

Beispiel: Pumpstation

- 7 Motoren, je 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit pro Tag
- Betrieb läuft weiter, solange **mindestens** 5 Motoren arbeiten
- Frage: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls?



Pumpstation — Rechnung

$$Pr(X \geq 5) = Pr(X = 5) + Pr(X = 6) + Pr(X = 7) \approx 0.996$$

Komplementäres Ereignis (Ausfall, höchstens 4 Motoren):

$$Pr(\bar{X}) = 1 - Pr(X) \approx 0.004$$


Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls liegt bei ca. **0,4 %**.

Alternativ direkt: `pbinom(q = 4, size = 7, prob = .95)`



Halbe Normalverteilung

Die halbe Normalverteilung



Definition: Halbe Normalverteilung

Ignoriert man die (negativen) Vorzeichen der Normalverteilungswerte, erhält man die halbe Normalverteilung. Man “spiegelt” die negative Seite auf die positive.

- verwendbar, wenn normalverteilte Werte > 0 sein müssen
- zwei Parameter: Mittelwert und SD, analog zur Normalverteilung

Beispiele: Halbe Normalverteilung

- Entfernung eines Dart-Pfeils zur Mitte der Zielscheibe
- Entfernung des vom Baum gefallenen Apfels zum Stamm
- Abweichung des Gewichts eines Produkts vom Soll-Gewicht
- Reaktionszeiten einer Versuchsperson



Exponentialverteilung


Die Exponentialverteilung

- Alternative zur halben Normalverteilung
- Ähnlicher Verlauf, aber: Extremwerte sind **wahrscheinlicher**
- Vorteilhaft, wenn die Skalierung eines Phänomens unklar ist

$$X \sim \text{Exp}(1)$$



Exponentialverteilung vs. halbe Normalverteilung




Die Normalverteilung setzt der Streuung engere Grenzen als die Exponentialverteilung.

Eigenschaften der Exponentialverteilung

1. nur für positive Werte $x > 0$ definiert
2. steigt X um eine Einheit, ändert sich Y um einen **konstanten Faktor**
3. ein Parameter: **Rate** λ (“lambda”)
4. $\frac{1}{\lambda}$ gibt gleichzeitig Mittelwert und Streuung an
5. größeres $\lambda \rightarrow$ schnellerer “Verfall”, kleinere Streuung/Mittelwert (und umgekehrt)



Verschiedene Exponentialverteilungen



- Unterschiede zwischen Exponentialverteilungen kommen nur durch λ zustande
- in R: `qexp(p, rate)` für Quantile, `pexp()` für die Verteilungsfunktion

z. B. `qexp(p = .5, rate = 1/8)` $\approx 5,5$ — der Median dieser Verteilung

Verteilung wählen: ein Merksatz

Hinweis

Eine “gut passende” oder gar “richtige” Verteilung zu finden, ist nicht immer einfach. Im Zweifel lieber eine **liberalere** Verteilung wählen, die einen breiteren Raum an möglichen Werten zulässt — aber Extremwerte, die unrealistisch sind, sollte man trotzdem ausschließen.

Zusammenfassung

- **Gleichverteilung:** alle Ausprägungen gleich wahrscheinlich, konstante Dichte
- **Binomialverteilung:** $Pr(X = k|p, n) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ — Anzahl Treffer bei n Wiederholungen
- **Halbe Normalverteilung:** nur positive Werte, gespiegelte Normalverteilung
- **Exponentialverteilung:** Alternative zur halben NV, ein Parameter λ , extremere Werte möglich



Vielen Dank!

Fragen?

